


erettili



Quando si usano sostanze
psicoattive,
anche se naturali, e' molto
importante sapere cosa si
sta facendo.

Ogni individuo reagisce
diversamente: conosci te
stesso, il tuo corpo, le
tue risorse.

Non assumere mai alcuna
sostanza se non stai bene
mentalmente o fisicamente.

COS'E'

Abbiamo deciso di scrivere un materiale sui farmaci che curano la disfunzione erettile perché risulta evidente che, nella nostra società, esse vengano usate e abusate trasversalmente sia da giovani che meno giovani.

Le sostanze afrodisiache naturali sono state utilizzate nelle varie culture da tempo mentre solo recentemente sono stati introdotti nel mercato farmaceutico dei principi attivi che aiutano coloro che hanno disfunzioni dell'apparato genitale. Nonostante queste sostanze siano rimedi farmacologici da utilizzare strettamente sotto prescrizione medica, esse si sono ritagliate uno spazio nel mercato nero, divenendo accessibili anche per coloro che non

ne hanno "fisicamente" bisogno.

Come sempre non intendiamo interferire nelle sfere più intime delle persone, ma aprire spazi di discussione su un argomento (il sesso) che nel nostro Paese spesso viene vissuto con difficoltà ed imbarazzo.

SOSTANZE DI ORIGINE SINTETICA

Il citrato di sildenafil (nome commerciale VIAGRA), è un farmaco utilizzato nella terapia della disfunzione erettile. Inizialmente studiato per la cura dell'angina pectoris, durante i test clinici mostrò scarsa efficacia per l'angina, mentre gli effetti sull'erezione del pene furono evidenti. Fu brevettato nel 1996.

Il tadalafil (nome commerciale CIALIS) ha lo stesso

principio di funzionamento del più famoso Viagra. L'unica differenza è che il suo principio attivo ha un tempo di attività più lungo, permettendo un effetto più prolungato, stimato intorno alle 36 ore.

Il verdanafil (nome commerciale LEVITRA) ha caratteristiche analoghe al Viagra e al Cialis anche se il principio attivo è diverso. L'effetto del Levitra può durare fino a quasi cinque ore.

Tutti e tre questi farmaci della famiglia delle piperazine si presentano sotto forma di compresse, utilizzati nella terapia della disfunzione erettile, che consiste nell'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente. Questi medicinali aiutano a rilassare i vasi sanguigni nel

pene, permettendo l'afflusso di sangue al pene quando si è sessualmente stimolati.

Prima di iniziare il trattamento farmacologico dovranno essere effettuati degli esami al fine di diagnosticare la disfunzione erettile e le cause. Dal momento che esiste un grado di rischio cardiaco associato all'attività sessuale i medici prima di avviare qualsiasi trattamento dovranno valutare le condizioni cardiovascolari nei pazienti. Questi farmaci vanno assunti circa mezz'ora/ un'ora prima dell'attività sessuale e una sola volta al giorno. Il consumo di bevande alcoliche può compromettere temporaneamente la capacità di avere un'erezione.

EFFETTI INDESIDERATI:

Gli effetti indesiderati più comuni sono: cefalea e rossore al viso, congestione nasale ed effetti sulla vista.

Raramente dopo l'assunzione il paziente può avere erezioni prolungate e dolorose.

CHI NON DOVREBBE ASSUMERE QUESTI FARMACI

- Le donne; in quanto studi medici hanno dimostrato che l'utilizzo di questi medicinali da parte di una donna non hanno alcun effetto benefico ma può esserci il rischio di avvertire solo gli effetti indesiderati.

- Chi soffre di malattie cardiache (aritmie, angina pectoris, ictus ecc...)

- Chi soffre di ipo o ipertensione.
- Chi soffre d'insufficienze renali ed epatiche gravi.
- Chiunque sia allergico o abbia ipersensibilità verso uno degli eccipienti contenuto nei farmaci.
- Chiunque stia già assumendo altri farmaci se non sotto disposizione medica.

UN CONSIGLIO...

Oggi esistono numerose cause per cui non sempre si riesce ad essere naturali, nemmeno a letto, in molti si possono trovare a vivere delle ansie da prestazione dovute allo stress quotidiano ma anche alla nostra società dove sembra che

non sia più permesso "arrivare secondi" o fare "brutta figura". Affidandosi a questi farmaci per potenziare le proprie performance amatorie, si può finire nel credere che senza questo farmaco non si sia più in grado di riuscire ad avere rapporti sessuali soddisfacenti.

Soprattutto se ti trovi di fronte alla tua prima esperienza sessuale è normale che tu ti possa sentire imbarazzato o imbranato; l'ansia da prestazione è uno stato emotivo che in molti hanno dovuto affrontare. Vivere questa prima esperienza, ma anche le successive, sotto l'uso di questi farmaci può far passare momentaneamente le tue ansie ma in futuro potresti sentirti condizionato dall'assumere nuovamente stimolanti così che le tue ansie

potrebbero addirittura aumentare; forse la cosa migliore da fare è affrontare la sessualità in maniera positiva, accettando tutte le emozioni che ne possono derivare, perché solo l'esperienza ti permette di capire in quale modo puoi gestirti al meglio la tua sfera più personale e intima.

INTERAZIONI

L'uso combinato di medicine e altre sostanze psicoattive può risultare nocivo e pericoloso per la salute.

Sia i medicinali che le droghe hanno effetti a livello cerebrale e vengono scomposti nel fegato. E' per questo motivo che l'uso combinato di medicinali e droghe può avere ripercussioni

sull'efficacia della cura.

Il corpo non è in grado di distinguere tra medicina o droga. Nel caso in cui si assuma un medicamento e un'altra sostanza psicoattiva che hanno entrambi effetti sul cervello, c'è il pericolo che portino ad un'intensificazione o un indebolimento del medicamento. Questa interferenza delle droghe sui medicinali può inevitabilmente influire sul tuo stato di salute e risulta spesso un cocktail pericoloso.

Il fegato scompone le sostanze di cui sono formati medicinali e altre droghe. Queste sostanze lasciano il corpo attraverso urine e feci. Visto che il fegato è in grado di scomporre una sola sostanza alla volta, c'è il rischio che, qualora più sostanze vengono assunte, altre sostanze non

vengano scomposte rimanendo troppo a lungo nel corpo. Talvolta succede invece che il fegato risponde a tale sovraccarico scomponendo le sostanze in modo troppo veloce. Alcune delle sostanze presenti nei medicinali possano quindi essere espulse prima che abbiano il tempo d'agire.

L'uso combinato di varie sostanze psicoattive (che siano farmaci o altre sostanze legali o illegali) e' assolutamente sconsigliata.

Riportiamo di seguito alcuni dei mix più utilizzati:

- Piperazine ed Ecstasy: nonostante la combinazione di piperazine ed ecstasy stimolano l'attività sessuale, abusare di questa combinazione di sostanze è però molto pericoloso: l'impatto sui neuroni deputati al rilascio di Serotonina e

Dopamina è molto forte, lo sforzo richiesto al cuore è molto alto.

Vi sono dei rischi anche per il sistema circolatorio, e quindi anche per la capacità di erezione.

Quindi: chi è cardiopatico, o iperteso, non deve assolutamente usare ecstasy e piperazine. Se si è comunque determinati a fare questa esperienza, la logica suggerisce di applicare il "principio di cautela" (assumendo bassi dosaggi) e di lasciar passare un po' di tempo tra un'assunzione e l'altra.

PIPERAZINE E COCAINA

La cocaina produce una vasocostrizione periferica con conseguente diminuzione dell'afflusso di sangue agli organi, per cui può contrastare gli effetti dei medicinali.

Inoltre tra gli effetti della cocaina ci sono l'aumento della pressione arteriosa e la possibile comparsa di danni cardiaci per costrizione delle coronarie, condizione questa che controindica l'uso delle piperazine; insomma, una specie di brusca ginnastica non richiesta alle vene e alle arterie sia del cuore sia dell'apparato sessuale. Da ultimo, l'aumento dell'ansia causato dalla cocaina, non facilita di certo l'attività sessuale...

PIPERAZINE E POPPER

le piperazine hanno un meccanismo d'azione che rafforza gli effetti ipotensivi del popper. Alcune persone consumano nitriti di amile (poppers), in particolare durante i rapporti sessuali. Attenzione: l'uso simultaneo di poppers e farmaci

porta a forti abbassamenti di pressione che possono portare a uno stato di choc e a volte alla morte. Anche se rare, erezioni prolungate o casi di priapismo (erezioni dolorose di più di 6 ore) sono stati rilevati in seguito al consumo di queste sostanze. In questi casi, consultare immediatamente un medico: il rischio di un danno permanente ai tessuti erettili può portare a una perdita irrimediabile delle capacità sessuali.

Qualora prendessi dei farmaci, chiedi al tuo medico curante quali possono essere gli effetti se assunti con sostanze psicotrope legali e illegali. Non dimenticare che il tuo medico è tenuto al segreto professionale!



LA CAROVANA O.N.L.U.S
Via Pellizza da Volpedo, 30
Bologna - tel. 051-494721
www.lacarovanacoop.com

Si ringrazia per la collaborazione
e la fornitura di testi U. P. Reggio Emilia

